



E.H.P.A.D.
42570 – SAINT-HEAND

Réf : Véronique L132 à 135

PROTOCOLE HYGIENE BUCCO-DENTAIRE.

La cause principale de la parodontopathie (retrait des tissus du collet et lésions inflammations de la gencive) est la mauvaise hygiène dentaire.

1) – Insister sur l'hygiène

- **Brossage des dents** 1 à 3 fois par jour.
- Le personnel brossera les dents de la personne dépendante psychologiquement ou physiquement sinon incitera la personne lucide ou possédant une bonne motricité des bras à le faire. Il vérifiera l'état de la brosse à dents et la présence de dentifrice. Le patient peut avaler le dentifrice sans risque. Il faut insister sur le nettoyage des espaces interdentaires.
- **Hygiène des prothèses :**
1 fois par jour lavage des prothèses avec le matériel adéquat donné par les familles.

1) - Convaincre de la nécessité de prothèses dentaires en cas d'édentition.

2) – Adresser au dentiste au moindre problème, penser au détartrage tous les 6 mois à 1 an.

3) – Soins locaux et généraux si nécessaire.

4) – Savoir regarder la langue et les gencives.

On insistera sur la prévention de la bouche sèche et la prévention de la candidose buccale. (voir ci-dessous).

INFORMATION

Principales causes de bouches sèches.

- Médicaments

- ⇒ neuroleptiques
- ⇒ diurétiques

Radiothérapie

Certaines maladies comme : le diabète,
le lupus

- ⇒ anti hypertenseurs centraux

- Causes transitoires

- ⇒ fièvre
- ⇒ déshydratation
- ⇒ respiration bouche ouverte
- ⇒ diabète déséquilibré

FACTEURS FAVORISANT LA CANDIDOSE BUCCALE

⇒ Médicamenteux - cortisone
- antibiotique

⇒ Locaux - bouche sèche
- dentier
- mauvaise hygiène

⇒ Généraux - diabète
- dénutrition
- maladie du sang

Démarche qualité septembre 2004

Vu le Directeur : Vu le Cadre Supérieur de Santé : Vu le Médecin coordonnateur :